

METHODVS GENERALIS SUM- MANDI PROGRESSIONES.

AVCTORE

Leonb. Eulero.

§. I.

Proposui anno praeterito methodum innumeras progressionis summam habentes extendit, sed earum etiam, quae algebraice summari nequeunt, summas a quadraturis curvarum pendentes exhibet. Synthetica tum usus sum methodo; generalibus enim assumtis formulis quaesivi series, quarum summae iis formulis exprimerentur. Hocque modo plurimas series generales adeptus sum, quarum summas poteram assignare. Proposita igitur quapiam progressionem summam, necesse erat eam cum illis formulis comparare, et indagare, num in aliqua earum contineatur. Potuissim autem numerum earum generalium serierum in infinitum multiplicare, et propterea saepius mihi series occurrerunt, quae etiam si in datis generalibus non comprehenderentur, ipsa tamen methodo poterant summari. Quo igitur facilius magisque in promptu sit seriei cuiuscunque propositae summam, si quidem fieri potest, inuenire, communicabo hic methodum analyticam, qua ex ipsius seriei natura terminum summatorum exuere licet. Latissime ea patet; non solum enim omnium earum serierum, quarum summae tot diversis modis iam sunt erutae, sed infinitarum

tarum aliarum summas simili et facili operatione invenire docet.

§. 2. Si aequè esset facile dato termino generali invenire summatorium, ac inversè ex summatorio generalem maximum hoc esset subsidium in summatione serierum. Potest quidem inter terminum summatorium et generalem dari aequatio, at quia ex infinitis constat terminis, ex ea non multum adiuvamur. At tamen insigne inde nascitur compendium, ad progressionum algebraicarum summas exhibendas. Sit terminus generalis seu is, cuius exponens est n in progressionem quancunque t , et terminus summatorius seu summa omnium terminorum a primo vsque ad $t=s$; erit $t = \frac{ds}{dn} - \frac{dds}{1.2.dn^2} + \frac{d^3s}{1.2.3.dn^3} - \frac{d^4s}{1.2.3.4.dn^4} + \text{etc.}$ in qua aequatione positum est dn constans. Transmutari autem haec aequatio potest in hanc $s = \int t dn + \alpha t + \frac{\beta dt}{dn} + \frac{\gamma d^2t}{dn^2} + \frac{\delta d^3t}{dn^3} + \text{etc.}$ in qua coefficientes α, β, γ etc. sequentes habent valores, $\alpha = \frac{1}{2}$; $\beta = \frac{\alpha}{2} - \frac{1}{6}$; $\gamma = \frac{\beta}{2} - \frac{\alpha}{6} + \frac{1}{24}$; $\delta = \frac{\gamma}{2} - \frac{\beta}{6} + \frac{\alpha}{24} - \frac{1}{120}$; $\epsilon = \frac{\delta}{2} - \frac{\gamma}{6} + \frac{\beta}{24} - \frac{\alpha}{120} + \frac{1}{720}$; etc. Fiet autem $s = \int t dn + \frac{t}{2} + \frac{dt}{12 dn} - \frac{d^2t}{720 dn^3} + \frac{d^3t}{30240 dn^5}$ etc. Quoties igitur t eiusmodi habet valorem, ut series s praebens vel alicubi abrumpatur, vel fiat summabilis, tum ope huius aequationis reperietur s ex t . Euenit autem illud, si t est functio algebraica rationalis ipsius n , et praeterea si est fractio, modo n non in determinatorem ingrediatur. E.g. sit $t = n^2 + 2n$, erit $dt = 2ndn + 2dn$, $d^2t = 2dn^2$, $d^3t = 0$ etc. Erit ergo $s = \int (n^2 + 2n) dn + \frac{n^2 + 2n}{2} + \frac{2n + 2}{12} = \frac{n^3}{3} + \frac{3n^2}{2} + \frac{7n}{6} = \frac{2n^3 + 9n^2 + 7n}{6}$.

§. 3. Methodus autem, quam hic sum expositurus, ita se habet, vt progressio proposita certis quibusdam operationibus vel ad aliam simpliciore, quae summi potest, vel iterum ad se ipsam reducat; utroque enim modo summa progressionis propositae constabit. Operationes, quibus in hisce transformationibus vtor, sunt vel vulgares vt additio, subtractio etc. vel ex altiori analysi, sumtae vt differentiatio et integratio. Illa quidem aliis seriebus non inserviunt, nisi quarum summatio iam est cognita et algebraice assignari potest; His vero etiam progressionum summas algebraicas non habentium summae a curuarum quadraturis pendentes reperiuntur. Omnes autem series ad quas haec methodus accommodari potest, in se complectuntur progressionem geometricam, et huiusmodi habent formam $\alpha x^a + \beta x^{a+b} + \gamma x^{a+2b} + \delta x^{a+3b} + \text{etc.}$ Id quod non impedit, quo minus progressio quaecunque in hac forma contineatur.

§. 4. Vt a simplicissimis incipiam, sit progressio proposita geometrica, $x^a + x^{a+b} + x^{a+2b} + x^{a+3b} + \text{---} + x^{a+(n-1)b}$, in qua extremus terminus est is cuius index est n , atque hoc in sequentibus semper notetur, terminum vltimum esse eum, cuius index est n , ne opus habeam indices adscribere; et proinde etiam semper summam vsque ad terminum indicis n exhibebo. Ponatur summa progressionis propositae s , erit $s = x^a + x^{a+b} + x^{a+2b} + \text{---} + x^{a+(n-1)b}$ tunc fiet $s - x^a = x^{a+b} + x^{a+2b} + \text{---} + x^{a+(n-1)b}$, addatur vtrinque x^{a+nb} et diuidatur per x^b , prodibit $\frac{s - x^a + x^{a+nb}}{x^b} = x^a$

$= x^a + x^{a+b} + \dots + x^{a+(n-1)b} = s$. Habemus igitur
 aequationem $s - x^a + x^{a+nb} = s x^b$, ex qua inuenitur
 $s = \frac{x^a - x^{a+nb}}{1 - x^b}$; quae est summa progressionis geometri-
 cae propositae. Est ergo hoc exemplum, quo progressio
 proposita in se ipsam transmutatur. Si fuerit x fractio
 vnitate minor et n numerus infinite magnus, erit x^{a+nb}
 $= 0$ atque $s = \frac{x^a}{1 - x^b}$, summam praebebit progressionis
 geometricae $x^a + x^{a+b} + x^{a+2b} + \dots$ etc. in infinitum
 continuatae. Si fuerit $x = 1$ patet esse $s = n$, id vero
 difficilius apparet ex aequatione $s = \frac{x^a - x^{a+nb}}{1 - x^b}$, quia nu-
 merator et denominator euanescent. Vt vero valor
 hoc in casu inueniatur, ponatur $x = 1 - \omega$, denotante
 ω quantitatem infinite paruam, erit $x^a = 1 - a\omega$, $x^{a+nb} =$
 $1 - (a + nb)\omega$ et $x^b = 1 - b\omega$. Hincque fit $s = \frac{nb\omega}{b\omega} = n$.
 Apparet etiam si terminus generalis seriei fuerit $ax^{a+n-1} \cdot b$
 fore terminum summatorium $\frac{ax^a - ax^{a+nb}}{1 - x^b}$.

§. 5. Sit nunc proposita ista progressio $x^a + 2x^{a+b}$
 $+ 3x^{a+2b} + \dots + nx^{a+(n-1)b}$, cuius summa po-
 natur s . Erit $s - x^a = 2x^{a+b} + 3x^{a+2b} + \dots + nx^{a+(n-1)b}$
 addatur sequens terminus $(n+1)x^{a+nb}$ et diuidatur per
 x^b , erit $\frac{s - x^a + (n+1)x^{a+nb}}{x^b} = 2x^a + 3x^{a+b} + \dots +$
 $(n+1)x^{a+(n-1)b}$. Subtrahatur ab hac serie prior scili-
 cet

cet ipsa proposita prodibit $\frac{s - x^a + (n+1)x^{a+nb}}{x^b} - s =$

$$x^a + x^{a+b} + x^{a+2b} - \dots - x^{a+(n-1)b} - \frac{x^a - x^{a+nb}}{1-x^b}. \text{ Ex}$$

$$\text{hac inuenitur } s = \frac{x^a - (n+1)x^{a+nb}}{1-x^b} + \frac{x^{a+b} - x^{a+(n+1)b}}{(1-x^b)^2} \\ = \frac{x^a - (n+1)x^{a+nb} + nx^{a+(n+1)b}}{(1-x^b)^2} = \frac{x^a - x^{a+nb}}{(1-x^b)^2} - \frac{nx^{a+nb}}{1-x^b}$$

Qui est terminus summatorius respondens termino generali $nx^{a+(n-1)b}$. Si fuerit $x < 1$ et ponatur $n = \infty$ prodibit seriei propositae in infinitum continuatae summa =

$$\frac{x^a}{(1-x^b)^2}. \text{ Si autem fiat } x = 1 \text{ prodire debet summa}$$

progressionis $1 + 2 + 3 + 4 - \dots - n$, hic vero eadem, quae ante oritur difficultas, numeratore et denominatore euanescentibus; pono igitur iterum $x = 1 - \omega$ erit

$$1 - x^b = b\omega; x^a = 1 - a\omega + \frac{a(a-1)\omega^2}{2}; x^{a+nb} = 1 - (a+nb)\omega \\ + \frac{(a+nb)(a+nb-1)\omega^2}{2} \text{ et } x^{a+(n+1)b} = 1 - (a+(n+1)b)\omega \\ + \frac{(a+(n+1)b)(a+(n+1)b-1)\omega^2}{2} \text{ fitque } s = \frac{(n^2b^2 + n^2)\omega^2}{2b^2\omega^2} = \frac{nn+n}{2}.$$

$$\text{Praeterea si terminus generalis fit } \S nx^{a+(n-1)b} \text{ erit terminus summatorius } = \frac{\S x^a - \S x^{a+nb}}{(1-x^b)^2} - \frac{\S nx^{a+nb}}{1-x^b}.$$

§. 6. Simili modo inuenientur termini summatorii, si termini generales sint $n^2 x^{a+(n-1)b}$, $n^3 x^{a+(n-1)b}$ etc. semper enim summatio reducitur ad summationem seriei gradus inferioris. Ex quo intelligitur hac ratione inueniri posse generaliter terminum summatorium spon-

spondentem termino generali $(\alpha + \epsilon n + \gamma n^2 + \text{etc.})$
 $x^{\alpha + (n-1)\epsilon}$. In his autem absoluendis longius non im-
 moror, quia iam dudum satis sunt cognita. Ideo haec
 tantum attuli, ut methodi vis etiam per vulgares ope-
 rationes pateat. Progredior igitur ultra, et quaenam
 series ope differentiationis et integrationis in summam
 redigi queant, inuestigabo. Primo quidem etiam pro-
 gressiones algebraicae modo tractatae summantur, et
 summae inveniuntur a iam datis non differentes; attamen
 earum inuentio per has operationes videtur facili-
 or et breuior. Hanc ob rem ab his iterum incipio.

§. 7. Sit progressio summanda $x + 2x^2 + 3x^3 +$
 $4x^4 + \dots + nx^n$ ponatur $ea = s$; diuidatur per x et mul-
 tiplicetur per dx , erit $\frac{sdx}{x} = dx + 2x dx + 3x^2 dx +$
 $\dots + nx^{n-1} dx$, sumtisque integralibus habetur $\int \frac{sdx}{x} =$
 $x + x^2 + x^3 + \dots + x^n = \frac{x - x^{n+1}}{1-x}$. Ex aequatione igitur

$\int \frac{sdx}{x} = \frac{x - x^{n+1}}{1-x}$ differentiata inuenietur s . Erit

enim $\frac{sdx}{x} = \frac{dx - (n+1)x^n dx + nx^{n+1} dx}{(1-x)^2}$, unde

prodit $s = \frac{x - (n+1)x^{n+1} + nx^{n+2}}{(1-x)^2}$, ut ante §. 5. si

ibi loco a et b scribatur 1. Ex hoc intelligi potest
 quomodo progressionis $ax^\alpha + (a+b)x^{\alpha+\epsilon} + (a+2b)x^{\alpha+2\epsilon} +$
 $\dots + (a+(n-1)b)x^{\alpha+(n-1)\epsilon}$ summa sit in-
 uenienda. Ponatur enim haec summa quaesita s , et mul-
 tiplicetur per $x^\pi dy$, erit $x^\pi s dy = ax^{\alpha+\pi} dy + (a+b)x^{\alpha+\epsilon+\pi}$

Tom. VI.

K

$x^{\alpha+\epsilon+\pi}$

$x^{a+\varepsilon+\pi} dy - - - (a+(n-1)b)x^{a+(n-1)b+\pi} dy$. Fiat
iam $x^{a+\pi} = y^{a-1}$, et $x^{a+\varepsilon+\pi} = y^{a+b-1}$; erit $x^\varepsilon = y^b$
et $x = y^{b/\varepsilon}$. Hincque fiet $x^{a+\pi} = y^{(a+\pi)b/\varepsilon} = y^{a-1}$. Er-
go erit $\pi = \frac{\varepsilon a - a - b}{b}$. Atque $x^{a+(n-1)b+\pi} = y^{a+(n-1)b-1}$.

His positis erit $x^{\frac{\varepsilon a - a - b}{b}} s dy = a y^{a-1} dy + (a+b)$
 $y^{a+b-1} dy + - - - (a+(n-1)b) y^{a+(n-1)b-1} dy$, sum-
tisque integralibus $\int x^{\frac{\varepsilon a - a - b}{b}} s dy = y^a + y^{a+b} + - - -$
 $+ y^{a+(n-1)b} = \frac{y^a - y^{a+nb}}{1 - y^b}$. Quia vero est $y^b = x^\varepsilon$; erit

$y = x^{\frac{\varepsilon}{b}}$ et $dy = \frac{\varepsilon}{b} x^{\frac{\varepsilon}{b}-1} dx$, hisque substitutis $\frac{\varepsilon}{b} \int x^{\frac{\varepsilon a - a - b}{b}}$
 $s dx = \frac{x^{\frac{\varepsilon a}{b}} - x^{\frac{\varepsilon a + nb}{b}}}{1 - x^\varepsilon}$. Haec eadem aequatio pot-

est facilius sine permutatione variabilis x inueniri hoc
modo: Multiplicetur progressio proposita per $p x^\pi dx$,
erit $p x^\pi s dx = p a x^{a+\pi} dx + - - - - p(a+(n-1)b)$
 $x^{a+(n-1)b+\pi} dx$. Determinentur p et π ita vt fit $a+$
 $(n-1)\varepsilon + \pi = p(a+(n-1)b) - 1$ seu $a + \pi +$
 $(n-1)\varepsilon = ap + (n-1)bp - 1$. Ex qua, quia p et π
ab n pendere nequeunt, duae resurgunt aequationes $\varepsilon =$
 bp et $a + \pi = ap - 1$, vnde prodit $p = \frac{\varepsilon}{b}$ et $\pi =$
 $\frac{\varepsilon a - a - b}{b}$. His substitutis, et integralibus sumtis, pro-
ueniet vt ante $\frac{\varepsilon}{b} \int x^{\frac{\varepsilon a - a - b}{b}} s dx = x^{\frac{\varepsilon a}{b}} + x^{\frac{\varepsilon a + nb}{b}} - - -$
 $+ x^{\frac{\varepsilon a + (n-1)nb}{b}} = \frac{x^{\frac{\varepsilon a}{b}} - x^{\frac{\varepsilon a + nb}{b}}}{1 - x^\varepsilon}$.

§. 8. Sit progressionis propositae terminus ordine
 n , hic $(an+b)(cn+e)x^{a+(n-1)b}$; ponatur huius ter-
minus

minus summatorius s : erit $s = (a+b)(c+e)x^\alpha + (2a+b)(2c+e)x^{\alpha+\beta} + \dots + (an+b)(cn+e)x^{\alpha+(n-1)\beta}$, multiplicetur per $px^\pi dx$, fiet $psx^\pi dx = p(a+b)(c+e)x^{\alpha+\pi} dx + \dots + p(an+b)(cn+e)x^{\alpha+(n-1)\beta+\pi} dx$. Sit $p cn + pe = \alpha + n\beta - \beta + \pi + 1$, debeat esse $p = \frac{\beta}{a}$ et $\pi = \frac{\beta e + \beta c - \alpha c - c}{c}$. Ergo sumtis integralibus erit $\frac{\beta}{c} \int \pi^\pi s dx = (a+b)x^{\alpha+\pi+1} + \dots + (an+b)x^{\alpha+(n-1)\beta+\pi+1}$. Multiplicetur denuo per $qx^\rho dx$, erit $\frac{\beta}{c} q x^\rho dx \int \pi^\pi s dx = q(a+b)x^{\alpha+\pi+\rho+1} dx + \dots + q(an+b)x^{\alpha+(n-1)\beta+\pi+\rho+1} dx$, fiatque $anq + bq = \alpha + n\beta - \beta + \pi + \rho + 2$, hinc erit $q = \frac{\beta}{a}$ et $\rho = \frac{\beta b - \alpha a + \beta a - \pi a - 2a}{a} = \frac{\beta b c - \alpha c - \beta a e}{ac}$. Sumtisque integralibus proveniet $\frac{\beta^2}{ac} \int x^\rho dx \int \pi^\pi s dx = x^{\alpha+\pi+\rho+2} + \dots + x^{\alpha+(n-1)\beta+\pi+\rho+2} = \frac{x^{\alpha+\pi+\rho+2} - x^{\alpha+n\beta+\pi+\rho+2}}{1 - x^\beta}$

seu haec aequatio $\frac{\beta^2}{ac} \int x^{\frac{\beta b c - \beta a e - \alpha c}{ac}} dx \int x^{\frac{\beta e + \beta c - \alpha c - c}{c}} s dx = \frac{x^{\frac{\beta(c+b)}{a}} - x^{\frac{\beta(a+b+na)}{a}}}{1 - x^\beta} = x^{\frac{\beta(a+b)}{a}} \left(\frac{1 - x^{n\beta}}{1 - x^\beta} \right)$. Simili modo

operatio est instituenda, si plures duobus factores fuerint in termino generali, ex quo simul apparet, tot prodire signa integralia, quot sunt factores in coefficiente termini generalis.

§. 9. Si fuerit progressionis summandae terminus generalis $\frac{x^{\alpha+(n-1)\beta}}{an+b}$, operatio a priori in hoc tantum differt, quod hic differentiatione absolui debeat, quod

ibi integralibus sumendis perficiebatur. Sit igitur terminus summatorius quaesitus s , erit $s = \frac{x}{a+b} + \dots$

$$+ \frac{x^{\alpha+(n-1)\beta}}{an+b}, \text{ atque } px^{\pi}s = \frac{px^{\alpha+\pi}}{a+b} + \dots + \frac{px^{\alpha+(n-1)\beta+\pi}}{an+b}. \text{ Sumantur differentialia prodibit } px^{\pi}$$

$$ds + p\pi x^{\pi-1}s dx = \frac{p(\alpha+\pi)x^{\alpha+\pi-1}dx}{a+b} + \dots + \frac{p(\alpha+n\beta-\beta+\pi)x^{\alpha+(n-1)\beta+\pi-1}dx}{an+\beta}. \text{ Fiat } pa + pn\beta$$

$$-p\beta + p\pi = an+b, \text{ erit } p = \frac{a}{\beta} \text{ et } \pi = \beta - \alpha + \frac{b\beta}{a}. \text{ Ergo } \frac{ax^{\beta-\alpha+\frac{b\beta}{a}}ds + (a\beta - a\alpha + b\beta)x^{\beta-\alpha+\frac{b\beta}{a}-1}sdx}{\beta dx}$$

$$= x^{\frac{a\beta+b\beta-a}{a}} + \dots + x^{\frac{na\beta+l\beta-a}{a}} = x^{\frac{a\beta+l\beta-a}{a}} \left(\frac{1-x^{n\beta}}{1-x^{\beta}} \right). \text{ Seu } \frac{a}{\beta} x^{\frac{a\beta-a\alpha+b\beta}{a}} s = \int x^{\frac{a\beta+b\beta-a}{a}} d\lambda \left(\frac{1-x^{n\beta}}{1-x^{\beta}} \right)$$

$$\text{vel } s = \frac{\beta}{a} x^{\frac{a\alpha-a\beta-l\beta}{a}} \int x^{\frac{a\beta+b\beta-a}{a}} d\lambda \left(\frac{1-x^{n\beta}}{1-x^{\beta}} \right). \text{ In hac}$$

formula integrale ita debet accipi vt posito $x=0$, ipsum euanescat. Si desideretur summa seriei propositae in

$$\text{infinitum continuatae, fiet } n=\infty \text{ et } s = \frac{\beta}{a} x^{\frac{a\alpha-a\beta-l\beta}{a}} \int \frac{x^{\frac{a\beta+b\beta-a}{a}} dx}{1-x^{\beta}}. \text{ Si sit } x=1. \text{ in expressione quidem}$$

summa s , quia differentialia insunt, non potest poni $x=1$, sed post integrationem fiat $x=1$. Attamen perinde est

est, quales numeri loco α et β substituantur, sit igitur
 $\alpha = \beta = 1$. Erit $s = \frac{1}{\alpha+b} + \frac{1}{2\alpha+b} + \dots + \frac{1}{n\alpha+b} =$
 $\frac{1}{a} \int \frac{x^a}{1-x} dx \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right)$. Atque post integrationem fieri
 debet $x \frac{1}{1-x} = 1$. Quemadmodum in dissertatione de sum-
 mationibus initio citata inueneram.

§. 10. Sit proposita progressio, cuius terminus or-
 dine n est $\frac{x^n}{(an+b)(cn+e)}$, assumo hic tantum x^n lo-

co $x^{\alpha+(n-1)\beta}$ tum compendii ergo, tum quia haec po-
 tentia in illam facili negotio potest transmutari. Sit
 terminus summatorius s , erit $p x^\pi s = \frac{p x^{\pi+1}}{(a+b)(c+e)} +$

$\frac{p x^{\pi+n}}{(an+b)(cn+e)}$. Adeoque $\frac{\text{diff. } p x^\pi s}{dx} =$

$\frac{p(\pi+1)x^\pi}{(a+b)(c+e)} + \dots + \frac{p(\pi+n)x^{\pi+n-1}}{(an+b)(cn+e)}$. Fiat $p\pi$

$+ p n = an + b$, erit $p = a$ et $\pi = \frac{b}{a}$. Ergo habetur

$\frac{a d(x^{\frac{b}{a}} s)}{dx} = \frac{x^{\frac{b}{a}}}{c+e} + \dots + \frac{x^{\frac{b}{a}+n-1}}{cn+e}$. Multiplice-

tur denuo per $p x^\pi$, erit $\frac{a p x^\pi d(x^{\frac{b}{a}} s)}{dx} = \frac{p x^{\frac{b}{a}+\pi}}{c+e} + \dots$

$\frac{p x^{\frac{b}{a}+\pi+n-1}}{cn+e}$. Hincque prodit $\frac{a p d(x^\pi d(x^{\frac{b}{a}} s))}{dx}$

$\frac{p(\frac{b}{a}+\pi)x^{\frac{b}{a}+\pi-1}}{c+e} + \dots + \frac{p(\frac{b}{a}+\pi+n-1)x^{\frac{b}{a}+\pi+n-2}}{cn+e}$

Fiat $\frac{pb}{a} + pn + p\pi - p = cn + e$; erit $p = c$ et $\pi = 1 - \frac{b}{a} + \frac{e}{c}$. His substitutis emerget ista aequatio

$$\frac{acd(x^{\frac{1-b+e}{a}c} d(x^{\frac{b}{a}} s))}{dx^2} = x^{\frac{e}{c}} + \dots + x^{\frac{e+n-1}{c}} = x^{\frac{e}{c}} \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right)$$

Sumantur iterum integralia, erit $\frac{acx^{\frac{1-b+e}{a}c} d(x^{\frac{b}{a}} s)}{dx} =$

$$\int x^{\frac{e}{c}} dx \left(\frac{1-x}{1-x} \right): \text{hincque } s = \frac{1}{acx^{\frac{b}{a}}} \int x^{\frac{b}{a}-\frac{e}{c}} dx \int x^{\frac{e}{c}} dx$$

$$\left(\frac{1-x^n}{1-x} \right) = \frac{x^{\frac{b}{a}-\frac{e}{c}} \int x^{\frac{e}{c}} dx \left(\frac{1-x}{1-x} \right) - \int x^{\frac{b}{a}} dx \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right)}{(bc-ae)x^{\frac{b}{a}}}. \text{ Casus}$$

hic notandus est, si $bc = ae$, quo fit $s = 0$. Erit autem iuxta priorem formam $s = \frac{1}{acx^{\frac{b}{a}}} \int \frac{dx}{x} \int x^{\frac{b}{a}} dx \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right)$

$$\text{quae mutatur in hanc } s = \frac{\int x^{\frac{b}{a}} dx \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right) - \int x^{\frac{b}{a}} dx \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right) / x}{acx^{\frac{b}{a}}}$$

Casus hic accidit, si denominatores $(an+b)(cn+e)$ fuerint quadrata vel horum quaedam multipla. Si fuerit $x=1$, haec substitutio ut ante demum post integrationem fieri debet in quantitatibus signa integralia prae se habentibus, at in finitis statim fieri potest $x=1$.

$$\text{Erit ergo } s = \frac{\int (x^{\frac{e}{c}} - x^{\frac{b}{a}}) dx \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right)}{bc-ae}. \text{ Ex quo apparet}$$

si $x^{\frac{e}{c}} - x^{\frac{b}{a}}$ potest diuidi per $1-x$ summam progressionis esse algebraicam. At casu quo $bc = ae$, fiet $lx = 0$,

$=0$, si scilicet fit $x=1$. Quocirca erit $s = \frac{\int x^a dx (1-x)^n}{\int x^a dx (1-x)^n}$

namque

§. 11. Simili modo intelligitur si n in denominatore 3 pluresue dimensiones habeat, quomodo summam inueniri oporteat, ita vt opus non fit pluribus exemplis operationem illustrare. Sit progressio propo-

fit haec cuius terminus generalis est $\frac{x^n}{(an+b)(cn+e)(fn+g)}$

summa huius sit s . Haec progressio eodem, quo praecedente §. modo tractata dabit post duas differentiationes

$$\frac{ac d(x^{\frac{1-a}{a+c}} d(x^{\frac{b}{a}} s))}{dx^2} = \frac{x^e}{x^c} + \dots + \frac{x^{\frac{e}{c}+n-1}}{nf+g}$$

$= (p. §. 9.) \frac{1}{f} x^{\frac{e}{c}-\frac{g}{f}-1} \int x^{\frac{f}{g}} dx (1-x)^n$ sumantur inte-

gralia erit $\frac{acfx^{\frac{1-a}{b}+\frac{e}{c}} d(x^{\frac{b}{a}} s)}{dx} = \int x^{\frac{e}{c}-\frac{g}{f}-1} dx \int x^{\frac{g}{f}} dx$

$(1-x)^n$, et denuo $acfx^{\frac{b}{a}} s = \int x^{\frac{b}{a}-\frac{e}{c}-1} dx \int x^{\frac{e}{c}-\frac{g}{f}-1} dx$

$\int x^{\frac{g}{f}} dx (1-x)^n$, adeoque $s = \frac{1}{acfx^{\frac{b}{a}}} \int x^{\frac{b}{a}-\frac{e}{c}-1} dx \int x^{\frac{e}{c}-\frac{g}{f}-1}$

$dx \int x^{\frac{g}{f}} dx (1-x)^n$. Ne plura signa integralia post se inuicem sint posita, haec forma in sequentem transmutari potest $s = \frac{\int x^{-\frac{g}{f}} \int x^{\frac{g}{f}} dx (1-x)^n}{(bf-ag)(ef-cg)} + \frac{\int x^{-\frac{e}{c}} \int x^{\frac{e}{c}} dx (1-x)^n}{(bc-ae)(cg-ef)}$

$$+ \dots$$

$$+ \frac{ax^{-\frac{b}{a}} \int x^{\frac{b}{a}} dx \left(\frac{1-x}{1-x} \right)^n}{(ae-bc)(ag-bf)}. \quad \text{Ex hoc simul apparet, si plu-}$$

res fuerint factores in termino generali, quam formam habitura sit summa. Sit enim terminus generalis

$$\frac{x^n}{(an+b)(cn+e)(fn+g)(bn+k)} \quad \text{erit terminus summa-}$$

$$\text{torius } s = \frac{1}{acfbx^{\frac{b}{a}}} \int x^{\frac{b}{a}-\frac{e}{c}-1} dx \int x^{\frac{e}{c}-\frac{g}{f}-1} dx \int x^{\frac{g}{f}-\frac{k}{b}-1}$$

$$dx \int x^{\frac{k}{b}} dx \left(\frac{1-x}{1-x} \right)^n = \frac{ax^{-\frac{b}{a}} \int x^{\frac{b}{a}} dx \left(\frac{1-x}{1-x} \right)^n}{(ae-bc)(ag-bf)(ak-bb)} +$$

$$\frac{cx^{-\frac{e}{c}} \int x^{\frac{e}{c}} dx \left(\frac{1-x}{1-x} \right)^n}{(bc-ae)(cg-ef)(ck-eb)} + \frac{fx^{-\frac{g}{f}} \int x^{\frac{g}{f}} dx \left(\frac{1-x}{1-x} \right)^n}{(bf-ag)(ef-cg)(fk-gk)}$$

$$+ \frac{kx^{-\frac{k}{b}} \int x^{\frac{k}{b}} dx \left(\frac{1-x}{1-x} \right)^n}{(bb-ak)(eb-ck)(gb-fk)}. \quad \text{Si desideretur summa ca-}$$

fu, quo $x=1$. erit pro termino generali $\frac{1}{(an+b)(cn+e)(fn+g)}$

$$\text{terminus summatorius } s = \frac{\int dx \left(\frac{1-x}{1-x} \right)^n ((aef-bcf)x^{\frac{g}{f}} + (bcf-a$$

$$eg)x^{\frac{e}{c}} + (acg-aef)x^{\frac{b}{a}})}{(ae-bc)(ag-bf)(cg-ef)}$$

Quoties igitur quantitas in dx

$\left(\frac{1-x}{1-x} \right)^n$ ducta dividi potest per $1-x$ tunc progressio proposita algebraicam habet summam. Accidit hoc si $\frac{b}{a} - \frac{e}{c}$ et $\frac{e}{c} - \frac{g}{f}$ sunt numeri integri. Praeterea hoc etiam est notandum omnes huiusmodi progressionem vel algebraice esse summabiles, vel a logarithmis siue realibus

libus sine imaginariis pendere, neque ullam aliam quadraturam huiusmodi progressionem posse exprimi,

§. 12. At cum difficile sit has formulas ad eos casus accommodare, quibus denominatorum factores sunt aequales, libet hic hos casus in specie tractare: fit itaque

progressionis summandae terminus generalis $\frac{x^n}{(an+b)^3}$ et

summatorius s , erit $s = \frac{1}{a^3 x^{\frac{b}{a}}} \int \frac{dx}{x} \int \frac{dx}{x} \int x^{\frac{b}{a}} dx \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right)$ id

quod sequitur ex §. 11. ubi fit $c=f=a$ et $e=g=b$.

haec forma transmutata abit in hanc $s = \frac{1}{2} \frac{(lx)^2 \int x^{\frac{b}{a}} dx \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right)}{a^3 x^{\frac{b}{a}}}$

Si autem fuerit terminus generalis $\frac{x^n}{(an+b)^4}$, erit $s = \frac{(lx)^3 \int x^{\frac{b}{a}} dx \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right) + \frac{1}{2} \int x^{\frac{b}{a}} dx \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right) (lx)^2}{6 a^4 x^{\frac{b}{a}}}$.

Ex his apparet quomodo pro reliquis potentiis valor ipsius s progrediatur: generaliter enim si terminus generalis est $\frac{x^n}{(an+b)^m}$, erit summa $s = \frac{(lx)^{m-1} \int x^{\frac{b}{a}} dx \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right)}{(m-1) a^m x^{\frac{b}{a}}}$

erit $s = \frac{\left(\frac{1-x^n}{1-x} \right) - \left(\frac{m-1}{1} \right) (lx)^{m-2} \int x^{\frac{b}{a}} dx \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right) + \left(\frac{m-1}{1} \right) \left(\frac{m-2}{2} \right) (lx)^{m-3} \int x^{\frac{b}{a}} dx (lx)^2 \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right)}{(m-1) a^m x^{\frac{b}{a}}}$

1. 2. 3. --- (m-1) a^m x^{\frac{b}{a}} - etc.

—etc. Valores hi multo sunt simpliciores, si ponatur $x=1$, erit enim $lx=0$. Termino generali enim $\frac{1}{(an+b)^2}$ respondet hic summatorius $\frac{\int x^a dx (\frac{1}{x})^2 (\frac{1-x}{1-x})^n}{1 \cdot a^2}$; termino

generali $\frac{1}{(an+b)^3}$ hic $\frac{\int x^a dx (\frac{1}{x})^3 (\frac{1-x}{1-x})^n}{1 \cdot 2 \cdot a^3}$; atque termino

generali $\frac{1}{(an+b)^m}$ hic $\frac{\int x^a dx (\frac{1}{x})^m (\frac{1-x}{1-x})^n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (m-1) a^m} =$

$\frac{\int x^a dx (\frac{1}{x})^{m-1} (\frac{1-x}{1-x})^n}{a^m \int dx (\frac{1}{x})^{m-1}}$; quae integralia ita debent ac-

cipi ut posito $x=0$ tota summa euanescat, tum autem poni debet $x=1$, et quantitas resultans vera erit summa. Porro notetur si summa desideretur in infinitum continuatae progressionis, ubique tantum scribi debere

$\frac{1}{1-x}$ loco $\frac{1-x}{1-x}$.

§. 13. Duae iam pertractatae sunt progressionum classes, quarum illa habebat terminum generalem Ax^n haec vero $\frac{x^n}{A}$ denotante A quantitatem algebraicam ex n et constantibus constantem, ita tamen, ut n non habeat alios exponentes, nisi integros affirmatiuos. Ex his oritur tertia classis pro termino generali habens $\frac{Ax}{B}$, vbi A et B eiusdem modi quantitates algebraicas designant. Talis progressio reducitur etiam ad progressionem geometricam tollendo numeratorem A ope integrationis

tionis, et denominatorem B ope differentiationis, quem-
admodum in vtraque pertractata seorsum factum est. Sit

progressionis summandae terminus generalis $\frac{(an+b)x^n}{(a+b)}$ hu-
ius terminus summatorius ponatur s; erit $s = \frac{(a+b)x}{a+b}$

$+ \dots + \frac{(an+b)x^n}{a+b}$. Multiplicetur haec aequatio per

px^π , erit $px^\pi s = \frac{p(a+b)x^{\pi+1}}{a+b} + \dots + \frac{p(an+b)x^{\pi+n}}{a+b}$

sumantur differentialia, erit $pd(x^\pi s) = \frac{p(\pi+1)(a+b)x^\pi}{a+b} dx$

$+ \dots + \frac{p(\pi+n)(a+b)x^{\pi+n}}{a+b} dx$, fiat $pn + p\pi =$

$\frac{b}{a+b}$, erit $p = \frac{b}{a+b}$ et $\pi = \frac{b}{a+b}$. Ergo est $ad(x^\pi s) = (a+b)x^\pi dx$

$+ \dots + (an+b)x^\pi dx$. Multiplicetur denovo per px^π erit

$apx^\pi d(x^\pi s) = p(a+b)x^\pi dx + \dots + p(an+b)$

$x^\pi dx$. Sumantur integralia habebitur $apf x^{\pi+1} d$

$(x^\pi s) = \frac{ap(a+b)x^{\pi+1}}{b+a\pi+a} + \dots + \frac{ap(an+b)x^{\pi+1}}{b+a\pi+an}$

Fiat $aapn + a\pi p = an + a\pi + b$; erit $p = \frac{1}{a}$ et $\pi =$

$\frac{b}{a}$. Propterea est $\frac{a}{a} \int x^{\frac{b}{a}} - \frac{b}{a} d(x^{\frac{b}{a}} s) = x^{\frac{b}{a}+1} + \dots$

$+ \dots + x^{\frac{b}{a}+n} = x^{\frac{b}{a}+1} \left(\frac{1-x^{n+1}}{1-x} \right)$. Ex hac aequatione prodit $s =$

$\frac{a \int x^{\frac{b}{a}} - \frac{b}{a} d(x^{\frac{b}{a}+1} \left(\frac{1-x^{n+1}}{1-x} \right))}{a x^{\frac{b}{a}+1}}$. Si fuerit terminus genera-

lis $\frac{(an+b)(n+1)x^n}{a+b}$, huiusque summatorius ponatur s, pro-

dibit iisdem, quibus modo, absolutis operationibus, $\frac{a}{\alpha}$
 $\int x^{\frac{\delta}{\alpha}-\frac{b}{a}} d(x^{\frac{b}{a}} s) = (\gamma + \delta) x^{\frac{\delta}{\alpha}+1} + \dots + (\gamma n + \delta) x^{\frac{\delta}{\alpha}+n}$
 $x^{\frac{\delta}{\alpha}}$, multiplicetur iterum per $p x^{\pi} dx$ et sumantur in-
 tegralia, prodibit $\frac{a p}{\alpha} \int x^{\pi} dx x^{\frac{\delta}{\alpha}-\frac{b}{a}} d(x^{\frac{b}{a}} s) = \frac{a p (\gamma + \delta) x^{\frac{\delta}{\alpha}+\pi+2}}{\delta + \alpha \pi + 2 \alpha}$
 $+ \dots + \frac{a p (\gamma n + \delta) x^{\frac{\delta}{\alpha}+\pi+n+1}}{\delta + \alpha \pi + \alpha n + \alpha}$. Fiat $a \gamma p n +$
 $\alpha \delta p = \alpha + \delta + \alpha \pi + \alpha n$, erit $p = \frac{1}{\gamma}$ et $\pi = \frac{\delta}{\gamma} - \frac{\delta-1}{\alpha}$
 Ergo $\frac{a}{\alpha \gamma} \int x^{\frac{\delta}{\gamma}-\frac{\delta-1}{\alpha}} dx x^{\frac{\delta}{\alpha}-\frac{b}{a}} d(x^{\frac{b}{a}} s) = x^{\frac{\delta}{\gamma}+1} + \dots +$
 $x^{\frac{\delta}{\gamma}+n} = x^{\frac{\delta}{\gamma}+1} \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right)$. Quare $s = \frac{\alpha \gamma \int x^{\frac{\delta}{\alpha}-\frac{b}{a}} d(x^{\frac{b}{a}} - \frac{\delta-1}{\gamma} d(x^{\frac{\delta}{\gamma}+1}))}{a x^{\frac{b}{a}} dx} \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right)$

Sed huiusmodi progressionibus summandis diutius non
 immoror, sufficit enim methodum tradidisse, qua omnes
 summi possunt. Interim tamen et id valet, quod §. 11.
 dixi, omnes scilicet huiusmodi progressionibus vel alge-
 braice posse summi, vel summam a logarithmis siue
 realibus siue imaginariis pendere.

§. 14. Progredior nunc ad aliud progressionum
 genus, quarum termini generales algebraice exprimi
 non possunt, sed quae ad classem serierum hypergeo-
 metricarum pertinent. Huiusmodi series est $(\alpha + \delta) x$
 $+ (\alpha + \delta)(2\alpha + \delta) x^2 + \dots + (\alpha + \delta)(2\alpha + \delta) \dots$
 $(\alpha n + \delta) x^n$. Ponatur huius summa s , et multiplicetur
 per $p x^{\pi}$, erit $p x^{\pi} s = p(\alpha + \delta) x^{\pi+1} + \dots + p(\alpha + \delta)$
 $(2\alpha + \delta)$

$(2\alpha + \epsilon)x^{\pi+1} - (an + \epsilon)x^{\pi+2}$. Et huius, in dx ductae
integralis $\int x^{\pi} s dx = \frac{p(\alpha + \epsilon)x^{\pi+2}}{\pi+2} + \dots +$
 $\frac{p(\alpha + \epsilon)(2\alpha + \epsilon)(2\alpha + \epsilon) \dots (an + \epsilon)x^{n+\pi+1}}{n+\pi+1}$, fiat

$p\alpha + p\epsilon = n + \pi + 1$ erit $p = \frac{1}{\alpha}$ et $\pi = \frac{\epsilon}{\alpha} - 1$. Vnde
de prodit $\int x^{\frac{\epsilon}{\alpha}-1} s dx = x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} + (\alpha + \epsilon)x^{\frac{\epsilon}{\alpha}+1} + \dots +$
 $\frac{(\alpha + \epsilon)(2\alpha + \epsilon) \dots (a(n-1) + \epsilon)x^{\frac{\epsilon}{\alpha}+n}}{\epsilon+1}$. Divi-

datur per $x^{\frac{\epsilon}{\alpha}+1}$ habebitur $\frac{\int x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} s dx}{x^{\frac{\epsilon}{\alpha}+1}} - 1 = (\alpha + \epsilon)x +$
 $\frac{(\alpha + \epsilon)(2\alpha + \epsilon) \dots (a(n-1) + \epsilon)x^{n-1}}{\epsilon+1}$. Quae
est ipsa progressio proposita truncata termino ultimo.

Erit igitur $\frac{\int x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} s dx}{x^{\frac{\epsilon}{\alpha}+1}} - 1 = s - (\alpha + \epsilon)(2\alpha + \epsilon) \dots$

$(an + \epsilon) = s - A$. Huiusmodi autem formas finita ex-
pressionem exposui in alia iam praelecta dissertatione de ter-
minis generalibus progressionum transcendentalium, ex
qua si libet finitus valor loco A desumi potest. Erit
ergo $\int x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} s dx = \alpha x^{\frac{\epsilon}{\alpha}+1} + \alpha x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} s - \alpha A x^{\frac{\epsilon}{\alpha}+1}$, atque
 $x^{\frac{\epsilon}{\alpha}+1} s dx = (\alpha + \epsilon)x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} dx + (\alpha + \epsilon)x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} s dx + \alpha x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} ds$
 $-(\alpha + \epsilon + an)A x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} dx$ seu $s dx = (\alpha + \epsilon)x dx +$

$(\alpha + \epsilon)x s dx + \alpha x^2 ds - (\alpha + \epsilon + an)A x^{n+1} dx$. Ex
qua aequatione valor ipsius s erutus dabit summam pro-
gressionis propositae. Fieri etiam potest, ut factores
in termino sequente non vno tantum, sed duobus plu-

ribusue augeantur. Accedant semper duo de nouo, vt prodeat ista progressio $(\alpha + \epsilon)x + (\alpha + \epsilon)(2\alpha + \epsilon)(3\alpha + \epsilon)x^2 + \dots + (\alpha + \epsilon)(2\alpha + \epsilon) \dots (\alpha(2n-1) + \epsilon)x^n$. Huius summa vocetur s , erit $p \int x^\pi s dx = \frac{p(\alpha + \epsilon)x^{\pi+2}}{\pi+2} + \dots + \frac{p(\alpha + \epsilon)(2\alpha + \epsilon) \dots p(\alpha(2n-1) + \epsilon)x^{n+\pi+1}}{n+\pi+1}$. Fiat $2p\alpha n - p\alpha + p\epsilon = n + \pi + 1$ erit $p = \frac{1}{2\alpha}$, et $\pi = \frac{\epsilon - 3\alpha}{2\alpha}$. Vnde $\frac{\int x^{\frac{\epsilon-3\alpha}{2\alpha}} s dx}{2\alpha} = x^{\frac{\epsilon+\alpha}{2\alpha}} + \dots + (\alpha + \epsilon)(2\alpha + \epsilon) \dots (\alpha(2n-2) + \epsilon)x^{\frac{n+\epsilon-\alpha}{2\alpha}}$. Atque iterum $\frac{p \int x^\pi dx \int x^{\frac{\epsilon-3\alpha}{2\alpha}} s dx}{2\alpha} = \frac{2\alpha p x^{\frac{\epsilon+3\alpha}{2\alpha} + \pi}}{\epsilon + 3\alpha + 2\alpha\pi} + \dots + \frac{2\alpha p(\alpha + \epsilon) \dots}{\epsilon + \alpha} \frac{(\alpha(2n-2) + \epsilon)x^{n+\pi+\frac{\epsilon+\alpha}{2\alpha}}}{2\alpha}$. Fiat $4p\alpha^2 n - 4p\alpha^2 + 2p\alpha\epsilon = 2\alpha n + 2\pi\alpha + \alpha + \epsilon$; erit $p = \frac{1}{2\alpha}$ et $\pi = \frac{\epsilon-2\alpha}{2\alpha} - \frac{\alpha-\epsilon}{2\alpha} = -\frac{3}{2}$; consequenter $\frac{\int x^{-\frac{3}{2}} dx \int x^{\frac{\epsilon-3\alpha}{2\alpha}} s dx}{4\alpha^2 x^{\frac{\epsilon}{2\alpha}}} - \frac{1}{\epsilon} = (\alpha + \epsilon)x + \dots + (\alpha + \epsilon)(2\alpha + \epsilon) \dots (\alpha(2n-3) + \epsilon)x^{n-1} = s - Ax^n$ posito $A = (\alpha + \epsilon)(2\alpha + \epsilon) \dots (\alpha(2n-1) + \epsilon)$. Ex qua aequatione s innotescit.

§. 15. Simili modo operationem institui oportet, si in coefficiente termini sequentis, tres pluresue factores de nouo accedant. De quo notandum est,

est, tot semper in aequatione resultante signa integra-
lia sibi inuicem esse iuncta quot sunt factores, quibus
sequens quisque terminus augetur. Ita progressionis $(\alpha + \epsilon)$

$$\frac{\alpha}{1} + \frac{\alpha + \epsilon}{2} + \frac{\alpha + 2\epsilon}{3} + \dots + \frac{\alpha + (3n-2)\epsilon}{3n} \text{ summa}$$

$$\text{determinabitur ex hac aequatione } \frac{\int x^{-\frac{1}{3}} dx \int x^{-\frac{2}{3}} dx \int x^{-\frac{3}{3}} dx}{27\alpha^3 x^{\frac{1}{3}}}$$

Ex qua,
ut inductio ad sequentes casus fieri possit, notandum est,

esse terminum progressionis propositae ante pri-
mum, seu cum cuius index est α . Si factores qui in
potencias ipsius x educuntur non constituant progressio-
nem arithmeticam, sed aliam algebraicam altioris or-
dinis, operatio similiter debet institui; ut sit progres-
sio proposita $(\alpha + \epsilon)(\gamma + \delta)x + \dots + (\alpha + \epsilon)(2\alpha$
 $+ \epsilon) \dots (an + \epsilon)(\gamma + \delta)(2\gamma + \delta) \dots (\gamma n + \delta)x^n$

$$\text{ponatur huius summa } s, \text{ erit } p \int x^\pi dx = \frac{p(\alpha + \epsilon)(\gamma + \delta)x^{\pi+2}}{\pi+2}$$

$$\frac{p(\alpha + \epsilon) + \dots + p(an + \epsilon)(\gamma + \delta) + \dots + p(\gamma n + \delta)x^{n+\pi+1}}{n+\pi+1}$$

Ponatur $p\gamma n + p\delta = n + \pi + 1$; erit $p = \frac{1}{\gamma}$; et π

$$\text{Ergo } \frac{\int x^{\frac{\delta+\gamma}{\gamma}} dx}{\gamma} = \frac{(\alpha + \epsilon)x^{\frac{\delta+\gamma}{\gamma}}}{\frac{\delta+\gamma}{\gamma}}$$

$$(\alpha + \epsilon) + \dots + (an + \epsilon)(\gamma + \delta) + \dots + (\gamma(n-1) + \delta)x^{\frac{n+\delta}{\gamma}}$$

$$\text{Porro erit } \frac{p \int x^\pi dx \int x^{\frac{\delta-\gamma}{\gamma}} dx}{\gamma} = \frac{\gamma p(\alpha + \epsilon)x^{\frac{\delta+2\gamma+\pi}{\gamma}}}{\gamma}$$

$$\frac{\gamma p(\alpha + \epsilon) + \dots + \gamma p(an + \epsilon)(\gamma + \delta) + \dots + \gamma p(\gamma(n-1) + \delta)x^{\frac{n+\pi+\delta+\gamma}{\gamma}}}{\gamma n + \pi + \delta + \gamma}$$

$$\text{Fiat } p\alpha\gamma n + p\delta\gamma = \gamma n + \pi\gamma + \delta + \gamma, \text{ erit } p = \frac{\gamma}{\alpha}, \text{ et}$$

$$\frac{1}{a}, \text{ et } p = \frac{\beta}{a} - \frac{\delta}{\gamma} - 1 = \frac{\beta\gamma - a\delta - a\gamma}{a\gamma}. \quad \text{Ergo}$$

$$\frac{\int x^{\frac{\beta\gamma - a\delta - a\gamma}{a\gamma}} dx \int x^{\frac{\delta - \gamma}{\gamma}} s dx}{a\gamma} = x^{\frac{\beta + a}{a}} + \dots + (a + \delta)$$

$$\dots - (a(n-1) + \delta)(\gamma + \delta) - \dots - (\gamma(n-1) + \delta)x^{\frac{\beta}{a} + n}$$

$$\text{Consequenter } \frac{\int x^{\frac{\beta\gamma - a\delta - a\gamma}{a\gamma}} dx \int x^{\frac{\delta - \gamma}{\gamma}} s dx}{a\gamma x^{\frac{\beta + a}{a}}} - 1 = s - ABx^n.$$

Posito $A = (a + \beta) - (an + \beta)$ et $B = (\gamma + \delta) - (\gamma n + \delta)$. Hic est casus si progressionis, quam factores conficiunt terminus generalis est $(an + \beta)(\gamma n + \delta)$ seu $a\gamma n^2 + (a\delta + \beta\gamma)n + \beta\delta$. Comprehenduntur ergo sub hac forma omnes progressionis ordinis secundi. Superior autem formula ex qua s determinatur transmutatur in hanc

$$\frac{\int x^{\frac{\delta - \gamma}{\gamma}} s dx}{(\beta\gamma - a\delta)x^{\frac{\delta + \gamma}{\gamma}}} + \frac{\int x^{\frac{\beta - a}{a}} s dx}{(a\delta - \beta\gamma)x^{\frac{\beta + a}{a}}} =$$

$$1 + s - ABx^n. \quad \text{Ex qua facilius forma sequentium intelligi potest.}$$

§. 16. Considerabo nunc harum serierum reciprocas, in quibus potentiae ipsius x sunt diuisae per id, per quod ante erant multiplicatae. Sit igitur series summenda haec

$$\frac{x}{a + \beta} + \frac{x^2}{(a + \beta)(2a + \beta)} + \frac{x^3}{(a + \beta)(3a + \beta)} + \dots$$

huius summa ponatur s .

Erit $\frac{pd(xs)}{dx} = \frac{p(\pi + 1)x}{a + \beta} + \frac{p(\pi + 2)x}{(a + \beta)(2a + \beta)} + \dots + \frac{p(\pi + n)x}{(a + \beta)(na + \beta)}$. Fiat $p\pi + p = an + \beta$, erit $p = a$, et $\pi = \frac{a}{\beta}$. Quamobrem erit

$$\frac{ad(x^{\frac{a}{\beta}} s)}{dx} = x^{\frac{a}{\beta}} + \frac{x^{\frac{a}{\beta} + 1}}{a + \beta} + \dots$$

$$+ \dots + \frac{x^{\frac{\epsilon}{\alpha} + n - 1}}{x^{\alpha}} \quad \text{Et}$$

$$+ \dots + \frac{1}{(\alpha + \epsilon)(2\alpha + \epsilon) \dots (\alpha(n-1) + \epsilon)}$$

propterea $\frac{d(x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} s)}{x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} dx} = 1 + s - \frac{x^n}{A}$ posito vt ante $A =$

$(\alpha + \epsilon) \dots (\alpha n + \epsilon)$. Aequatio haec euoluta pr-

(8) bit $\alpha x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} ds + \epsilon x^{\frac{\epsilon}{\alpha} - \alpha} s dx = x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} dx + x^{\frac{\epsilon}{\alpha}} s dx - \frac{x^{\frac{\epsilon}{\alpha} + n}}{A} dx$

quae diuisa per $x^{\frac{\epsilon}{\alpha}}$ transit in $\alpha x ds + \epsilon s dx = x dx$
 + $x s dx - \frac{x^{n+1} dx}{A}$, seu $ds + \frac{\epsilon s dx}{\alpha x} = \frac{dx}{\alpha} - \frac{x^n dx}{A \alpha}$

Multiplicetur haec aequatio per $c^{\frac{x}{\alpha} \frac{\epsilon}{\alpha}}$, vbi c est nu-

merus, cuius log. est 1 , fiet ea integrabilis, prodibitque

$$c^{-\frac{x}{\alpha} \frac{\epsilon}{\alpha}} s = \frac{1}{\alpha} \int c^{-\frac{x}{\alpha} \frac{\epsilon}{\alpha}} dx (1 - \frac{x^n}{A}). \text{ Atque } s = \frac{1}{\alpha} c^{-\frac{x}{\alpha} \frac{\epsilon}{\alpha}} \int c^{\frac{x}{\alpha} \frac{\epsilon}{\alpha}} dx$$

$(1 - \frac{x^n}{A})$. Huius progressionis in infinitum continuatae summa

$$\text{igitur erit } \frac{1}{\alpha} c^{\frac{x}{\alpha} \frac{\epsilon}{\alpha}} \int c^{-\frac{x}{\alpha} \frac{\epsilon}{\alpha}} dx = \frac{\epsilon(\epsilon - \alpha)(\epsilon - 2\alpha) \dots}{\epsilon(\epsilon - \alpha)}$$

$$\frac{\epsilon(\epsilon - \alpha)}{\epsilon(\epsilon - \alpha)} = \frac{\epsilon(\epsilon - \alpha)}{\epsilon(\epsilon - \alpha)}$$

si fuerit $\epsilon = 0$, erit summa $= \alpha - 1$. Sin sit $\epsilon = \alpha$

erit summa $= \frac{\alpha c^{\frac{\alpha}{\alpha}}}{\alpha} = 1 - \frac{\alpha}{\alpha}$. Si vero ponatur $\epsilon = 2\alpha$,

$$\text{summa seriei erit } \frac{2\alpha^2 c^{\frac{\alpha}{\alpha}}}{x^2} = 1 - \frac{2\alpha}{x} - \frac{2\alpha^2}{x^2}; \text{ et ita porro.}$$

Ex quo intelligitur, quoties ϵ sit multipulum ipsius α ,
 summam seriei finita et integrata expressione exhiberi

posse. Si autem $\frac{6}{\alpha}$ euadat fractio formula inuenta integrari non potest.

§. 17. Crescat terminus quisque duobus factoribus, habebitur progressio haec $\frac{x^0}{(\alpha+6)} + \frac{x^2}{(\alpha+6)(3\alpha+6)} + \frac{x^4}{(\alpha+6)(5\alpha+6)} + \dots + \frac{x^n}{(\alpha+6)(\alpha(2n-1)+6)}$

cuius summa ponatur s . Erit $\frac{p d(x^\pi s)}{dx} = \frac{p(\pi+1)x^\pi}{\alpha+6} + \frac{p(\pi+2)x^{\pi+1}}{(\alpha+6)(3\alpha+6)} + \dots + \frac{p(\pi+n)x^{\pi+n-1}}{(\alpha+6)(\alpha(2n-1)+6)}$

fit $p\pi + pn = 2\alpha n - \alpha + 6$, erit $p = 2\alpha$ et $\pi = \frac{6-\alpha}{2\alpha}$

Idcirco $\frac{2\alpha d(x^{\frac{6-\alpha}{2\alpha}} s)}{dx} = \frac{6-\alpha}{x^{\frac{6-\alpha}{2\alpha}}} + \frac{6+\alpha}{x^{\frac{6-\alpha}{2\alpha}}(\alpha+6)(2\alpha+6)} + \dots + \frac{6-3\alpha+n}{x^{\frac{6-\alpha}{2\alpha}}(\alpha+6)(\alpha(2n-2)+6)}$ Atque iterum

$\frac{2\alpha p d(x^\pi d(x^{\frac{6-\alpha}{2\alpha}} s))}{dx^2} = \frac{p(6-\alpha+2\alpha\pi)}{2\alpha} x^{\frac{6-\alpha}{2\alpha}+\pi} + \dots$

$\dots + \frac{p(6-3\alpha+2\alpha\pi+2\alpha\pi)}{2\alpha(\alpha+6)(2\alpha+6)(\alpha(2n-2)+6)} x^{\frac{6-\alpha}{2\alpha}+\pi+\pi}$ Fiat $p6$

$-3p\alpha + 2p\alpha n + 2p\alpha\pi = 4\alpha^2 n - 4\alpha^2 + 2\alpha 6$, erit

$p = 2\alpha$, et $\pi = \frac{1}{2}$. Vnde prodit $\frac{4\alpha^2 d(x^{\frac{1}{2}} d(x^{\frac{6-\alpha}{2\alpha}} s))}{dx^2}$

$= 6x^{\frac{6-\alpha}{2\alpha}} + \dots + \frac{6-4\alpha+n}{x^{\frac{6-\alpha}{2\alpha}+n}(\alpha+6)(\alpha(2n-3)+6)} = 6x$

$$\frac{6-2\alpha}{x^{2\alpha}} + \frac{6-2\alpha}{x^{2\alpha}} - \frac{6-2\alpha}{x^{2\alpha}} + \dots + \frac{6-2\alpha}{x^{2\alpha}} + \pi$$

Simili modo operatio est instituenda, si terminus quisque pluribus factoribus in denominatore crescat. Nec non satis apparet, si progressio, quam factores denominatorum constituunt, non fuerit arithmetica sed algebraica altioris ordinis, quomodo ad aequationem, ex qua summa determinatur, perveniri oporteat. Scilicet quilibet factor in factores simplices est resoluendus, vt §. 15.

factum est, ubi terminus generalis factorum est $(\alpha n + \beta)$ $(\gamma n + \delta)$, qui omnes aequationes ordinis secundi sub se complectuntur. At ne hoc quidem opus est si sequenti modo operati libuerit. Ut proposita sit pro-

$$\frac{x^2}{1 \cdot 7} + \frac{x^3}{1 \cdot 7 \cdot 17} + \frac{x^4}{1 \cdot 7 \cdot 17 \cdot 31} + \dots$$

summa huius ponatur s, erit $\frac{pd(x^\pi s)}{dx}$

$$= p(\pi + 1)x^\pi + \dots + \frac{p(\pi + n)x^{n+\pi-1}}{1 \cdot 7 \dots (2n^2 - 1)} \text{ Atque de-}$$

$$\text{nuo } \frac{pd(x^\pi d(x^\pi s))}{dx} = p(\pi + 1)(\pi + 2)x^{\pi+2-1} +$$

$$\dots + \frac{p(\pi + n)(n + \pi + 2 - 1)x^{n+\pi+2-2}}{1 \cdot 7 \dots (2n^2 - 1)} \text{ Fiat}$$

$$pn^2 + 2p\pi n + p\pi^2 - pn + p\pi^2 + p\pi^2 - p\pi = 2n^2$$

$$\text{Atque } 2\pi^2 = -1 \text{ seu } \pi = \sqrt{-\frac{1}{2}} \text{ et } \pi = 1 - \sqrt{2} \text{ Qua-}$$

$$\text{re substituitur } \frac{2d(x^{1-\sqrt{2}}d(x^{\frac{1}{2}}s))}{(1-\sqrt{2})dx^2} = x^{-\sqrt{2}} + \dots +$$

$$\frac{x^{\frac{2n-2-\sqrt{2}}{2}}}{1.7 \dots (2n^2-4n+1)} = x^{\frac{-\sqrt{2}}{2}} + x^{\frac{-\sqrt{2}}{2}} \left(s - \frac{x^n}{1.7 \dots (2n^2-1)} \right).$$

Summa vero huius seriei in infinitum inuenietur ex hac aequatione $x^{-\sqrt{2}} dx^{\frac{\sqrt{2}}{2}} + 2x^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dd(x^{\frac{\sqrt{2}}{2}} s) = (2-2\sqrt{2})x^{\frac{-\sqrt{2}}{2}} dx ds + (\sqrt{2}-2)x^{\frac{-2-\sqrt{2}}{2}} s dx^2 + 2x^{\frac{2-\sqrt{2}}{2}} dds + 2\sqrt{2}x^{\frac{-\sqrt{2}}{2}} ds dx + (1-\sqrt{2})x^{\frac{-2-\sqrt{2}}{2}} s dx^2 = x^{\frac{-\sqrt{2}}{2}} dx^2 + x^{\frac{-\sqrt{2}}{2}} s dx^2 = 2x^{\frac{-\sqrt{2}}{2}} ds dx - x^{\frac{-2-\sqrt{2}}{2}} s dx^2 + 2x^{\frac{2-\sqrt{2}}{2}} dds.$ Seu $2xdds - \frac{sdx^2}{x} + 2dsdx = dx^2 + sdx^2$, ex qua aequatione irrationalia omnia euanescere.

§. 18. Si factores denominatorum constituent progressionem potentiarum, huiusmodi progressionum summas inuestigabo: vt sit progressio proposita $\frac{x}{(\alpha+\beta)^2} + \frac{x^2}{(\alpha+\beta)^2(2\alpha+\beta)^2} + \dots + \frac{x^n}{(\alpha+\beta)^2 \dots (n\alpha+\beta)^2}$

ponatur summa s , erit $p d \frac{(x^\pi s)}{dx} = \frac{p(\pi+1)x^\pi}{(\alpha+\beta)^2} + \dots + \frac{p(\pi+n)x^{n+\pi-1}}{(\alpha+\beta)^2 \dots (n\alpha+\beta)^2}$, fiat $p\pi + pn = \alpha n + \beta$, erit $p = \alpha$ et $\pi = \frac{\beta}{\alpha}$. Propterea $\frac{\alpha d(x^{\frac{\beta}{\alpha}} s)}{\alpha dx} =$

$$\frac{x^{\frac{\beta}{\alpha}}}{(\alpha+\beta)} + \dots + \frac{x^{\frac{\beta}{\alpha}+n-1}}{(\alpha+\beta)^2 \dots (n\alpha+\beta)}.$$

Porro

apd

$$\frac{\alpha^2 d(x d(x^\beta s))}{dx^2} = \frac{p(\beta + \alpha\pi)x^{\beta+\pi-1}}{\alpha(\alpha+\beta)} + \dots +$$

$$\frac{p(\beta + \alpha\pi + \alpha n - \alpha)x^{\beta+\pi+n-2}}{\alpha(\alpha+\beta)^2 - (\alpha n + \beta)^2} \dots \text{Fiat } p\alpha n + p\beta +$$

$$p\alpha\pi - p\alpha = \alpha^2 n + \alpha\beta. \text{ Ergo } p = \alpha, \text{ et } \pi = \frac{\alpha}{\alpha} = 1.$$

$$\text{Unde est } \frac{\alpha^2 d(x d(x^\beta s))}{dx^2} = x^\beta + \dots +$$

$$\frac{x^{\beta+n-1}}{(\alpha+\beta)^2 - (\alpha(n-1) + \beta)^2} = x^{\frac{\beta}{\alpha}} + x^{\frac{\beta}{\alpha}} \left(s - \frac{s}{(\alpha+\beta)^2 - (\alpha n + \beta)^2} \right). \text{ Et summa progressionis}$$

$$\text{in infinitum determinabitur aequatione } \frac{\alpha^2 d(x d(x^\beta s))}{x^\beta dx^2}$$

$$= 1 + s. \text{ Similiter si factores fuerint cubi summa progressionis } \frac{x}{(\alpha+\beta)^3} + \frac{x^2}{(\alpha+\beta)^3(2\alpha+\beta)^3} + \text{etc. in infinitum } s$$

$$\text{inuenietur ex hac aequatione } \frac{\alpha^3 d(x d(x d(x^\beta s)))}{x^\beta dx^3} =$$

$$= 1 + s. \text{ Atque ita porro pro sequentibus.}$$

§. 19. Sint nunc coëfficientes potentiarum ipsius x fractiones, quarum tam numeratores quam denominatores sint facti ex certo factorum numero pro indice, cuiusque termini crescente constantia. Ita sit progressio proposita haec $\frac{(a+b)x}{(\alpha+\beta)} + \frac{(a+b)(2a+b)}{(\alpha+\beta)(2\alpha+\beta)} x^2 + \dots + \frac{(a+b)(m+b)}{(\alpha+\beta)(m\alpha+\beta)} x^m$, huius summa ponatur s , erit psx^m

$$\begin{aligned}
 dx &= \frac{p(n+b)}{(\pi+n)\alpha+\beta} x^{\pi+2} + \dots + \frac{p(a+b) - (an+b)}{(\pi+n+1)\alpha+\beta - (an+b)} x^{\pi+n+1}. \text{ Fiat } apn + bp = \pi + n + 1, \text{ erit } p = \frac{1}{a} \\
 \text{et } \pi &= \frac{b-a}{a}. \text{ Adeoque } \frac{\int x^{\frac{b-a}{a}} s dx}{a} = \frac{x^{\frac{b-a}{a}}}{\alpha+\beta} + \dots + \\
 &\frac{(a+b) - (a(n-1)+b)}{(\alpha+\beta) - (an+\beta)} x^{\frac{b}{a}+n}. \text{ Et denuo } \frac{pd(x^{\pi} \int x^{\frac{b-a}{a}} s dx)}{a dx} \\
 &= \frac{p(b+a+\pi)}{a(\alpha+\beta)} x^{\frac{b}{a}+\pi} + \dots + \frac{p(b+m+\pi)(a+b) - (a(n-1)+b)}{a(\alpha+\beta) - (an+\beta)} x^{\frac{b}{a}+\pi+n-1}. \text{ Fiat } bp + apn + ap\pi = a\alpha n + a\beta, \\
 \text{erit } p &= \alpha, \text{ et } \pi = \frac{\beta}{\alpha} - \frac{b}{a}. \text{ Vnde erit } \frac{\alpha d(x^{\frac{\beta}{\alpha} - \frac{b}{a}} \int x^{\frac{b-a}{a}} s dx)}{a dx} \\
 &= x^{\frac{\beta}{\alpha}} + \dots + \frac{(a+b) - (a(n-1)+b)}{(\alpha+\beta) - (an+\beta)} x^{\frac{\beta}{\alpha}+n-1} = x^{\frac{\beta}{\alpha}} + \\
 &x^{\frac{\beta}{\alpha}} (s - \frac{(a+b) - (an+b)}{(\alpha+\beta) - (an+\beta)} x^{\frac{b}{a}}). \text{ Ex qua aequatione } s \text{ deter-} \\
 \text{minare licet. Si summa progressionis propositae in in-} & \\
 \text{finitum desideretur, erit } \frac{\alpha d(x^{\frac{\beta}{\alpha} - \frac{b}{a}} \int x^{\frac{b-a}{a}} s dx)}{a dx} &= x^{\frac{\beta}{\alpha}} + \\
 x^{\frac{\beta}{\alpha}} s, \text{ seu } \frac{\alpha}{a} (\frac{\beta}{\alpha} - \frac{b}{a}) x^{\frac{\beta}{\alpha} - \frac{b}{a}} \int x^{\frac{b-a}{a}} s dx + \frac{\alpha}{a} x^{\frac{\beta}{\alpha}} s &= \\
 x^{\frac{\beta}{\alpha}} + x^{\frac{\beta}{\alpha}} s. \text{ Quae abit in hanc } (\frac{\beta}{a} - \frac{\alpha b}{a^2}) x^{\frac{b-a}{a}} \int x^{\frac{b-a}{a}} s dx & \\
 + \frac{\alpha}{a} s = x + x s, \text{ vel hanc } (\frac{\beta}{a} - \frac{\alpha b}{a^2}) \int x^{\frac{b-a}{a}} s dx + \frac{\alpha}{a} x^{\frac{b}{a}} & \\
 s = x^{\frac{b+a}{a}} + x^{\frac{b+a}{a}} s. \text{ Haec differentiat dat } (\frac{\beta}{a} - \frac{\alpha b}{a^2}) x^{\frac{b-a}{a}} & \\
 s dx + \frac{\alpha}{a} x^{\frac{b}{a}} ds + \frac{\alpha^2}{a^2} x^{\frac{b-a}{a}} s dx = (\frac{b+a}{a}) x^{\frac{b}{a}} dx + x^{\frac{b+a}{a}} ds & \\
 + (\frac{b+a}{a}) x^{\frac{b}{a}} s dx, \text{ quae reducitur ad hanc } \frac{\beta}{a} s dx + \frac{\alpha}{a^2} & \\
 x ds &
 \end{aligned}$$

$x ds = (\frac{b+a}{a}) x dx + x^2 ds + (\frac{b+a}{a}) x s dx$. Seu $ds +$
 $\frac{\beta}{\alpha} \frac{dx}{x} = (\frac{b+a}{a}) \frac{dx}{x} + \frac{(b+a)x dx}{\alpha x^2}$. Multiplicetur haec aequa-
 tio per $\int \frac{\beta x^{\frac{b+a}{a}} - (b+a)x dx}{\alpha x^2}$ vel per $x^{\frac{\beta}{a}} (a-ax)^{\frac{b}{a} - \frac{\beta}{a} + 1}$. Erit
 $\frac{\beta}{\alpha} (a-ax)^{\frac{b}{a} - \frac{\beta}{a} + 1} s = (b+a) \int \frac{\beta}{\alpha} (a-ax)^{\frac{b}{a} - \frac{\beta}{a}} dx$.

Atque $s = \frac{(b+a) \int x^{\frac{\beta}{a}} (a-ax)^{\frac{b}{a} - \frac{\beta}{a}} dx}{x^{\frac{\beta}{a}} (a-ax)^{\frac{b}{a} - \frac{\beta}{a} + 1}}$. Summa igitur
 algebraice poterit assignari si vel $\frac{\beta}{a}$ vel $\frac{b}{a} - \frac{\beta}{a}$ fue-
 rit numerus integer affirmativus.

§ 26. Si progressio fuerit ex huiusmodi ipsius
 coefficientibus et algebraicis composita; primo coef-
 ficientes algebraici differentiatione et integratione de-
 bent tolli, ut ibi est factum, et tum progressio resul-
 tans modo hic exposito tractari. Ut sit progressio
 proposita $\frac{1}{1} + \frac{3x^2}{1.2} + \frac{5x^3}{1.2.3} + \dots + \frac{(2n-1)x^n}{1.2.3\dots n}$

summa huius ponatur s , erit $p \int x^{\pi} s dx = \frac{1 \cdot p x^{\pi+2}}{(\pi+2)1} +$
 $\dots + \frac{(2n-1)p x^{\pi+n+1}}{(\pi+n+1)(1.2.3\dots n)}$. Fiat $2np - p =$

$\pi + n + 1$, erit $p = \frac{1}{2}$ et $\pi = -\frac{3}{2}$. Ex quo erit
 $\int x^{-\frac{3}{2}} s dx = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{2} + \frac{x^{\frac{3}{2}}}{1.2} + \dots + \frac{x^{\frac{n-1}{2}}}{1.2.3\dots n}$. Mul-

tiplicetur per $x^{\frac{1}{2}}$, erit $\frac{x^2}{2} \int x^{-\frac{3}{2}} s dx = \frac{x^2}{1} + \frac{x^2}{1.2} +$
 $\dots + \frac{x^3}{1.2.3}$

$$\frac{x^3}{1.2.3} + \dots + \frac{x^n}{1.2.3 \dots n}. \text{ Ergo } \frac{d(x^{\frac{1}{2}} x^{-\frac{3}{2}} s dx)}{2 dx} = 1$$

$$+ \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1.2} + \dots + \frac{x^{n-1}}{1.2.3 \dots (n-1)} = 1 + \frac{x^{\frac{1}{2}} x^{-\frac{3}{2}} s dx}{2}$$

$$- \frac{x^n}{1.2.3 \dots n}, \text{ ex qua aequatione } s \text{ inuenietur. Erit}$$

$$\text{autem } \frac{\int x^{-\frac{3}{2}} s dx}{4 x^{\frac{1}{2}}} + \frac{s}{2x} = 1 + \frac{x^{\frac{1}{2}} x^{-\frac{3}{2}} s dx}{2} - \frac{x^n}{1.2.3 \dots n}$$

Ponatur $1.2.3 \dots n = A$, erit porro $(1-2x) \int x^{-\frac{3}{2}} s dx = \frac{1}{4x^{\frac{1}{2}}} - \frac{2s}{x^{\frac{1}{2}}} - \frac{4x^{n+\frac{1}{2}}}{A}$. Summa progressionis propositae in infinitum continuatae vero definiatur ex ista

aequatione $\int x^{-\frac{3}{2}} s dx = \frac{4x-2s}{(1-2x)\sqrt{x}}$; quae differentiat dat $\frac{s dx}{x\sqrt{x}} = \frac{2x dx + 4x dx + s dx - 6s dx - 2x ds + 4x^2 ds}{(1-2x)^2 x \sqrt{x}}$, seu $x dx + 2x^2 dx - s x dx - 2s x^2 dx - x ds + 2x^2 ds = 0$. Quae reducitur ad hanc $ds + \frac{s dx (1+2x)}{1-2x} = \frac{dx (1+2x)}{1-2x}$. Quae multiplicata per $\frac{e^{-x}}{1-2x}$ fit integrabilis, prodit autem

$$\frac{e^{-x} s}{1-2x} = \frac{\int e^{-x} dx (1+2x)}{(1-2x)^2} = \frac{e^{-x}}{1-2x} - 1. \text{ Atque hinc } s = 1 - e^x (1-2x). \text{ Quare si fuerit } x = \frac{1}{2} \text{ erit } s = 1. \text{ Adeoque}$$

$$1 = \frac{1}{1.2} + \frac{3}{1.2.4} + \frac{5}{1.2.3.8} + \frac{7}{1.2.3.4.16} + \text{etc. in infin.}$$

§. 21. Ex his apparet ad quas progressionis summendas methodus hac dissertatione exposita se extendat: scilicet ad omnes eas progressionis, quae comprehenduntur

dantur hoc termino generali $\frac{AP}{BQ} x^{an+\beta}$, vbi A et B designant terminos ordinis n , quarumcunque progressionum algebraicarum. Et P est factum ex $\gamma n + \delta$ terminis progressionis cuiusque algebraicae, itemque Q est simile factum ex $\varepsilon n + \zeta$ terminis etiam cuiuscunque progressionis algebraicae. Omnino autem summae huiusmodi progressionum tribus modis expositae inueniuntur. Vel enim praedit summa prorsus algebraica, vel assignatur quadratura quaequam, a qua summa pendet. Vel tertio aequatio reperitur, cuius variables quantitates s et x penitus non possunt a se inuicem separari, vt saltem constet, utrum progressio summam habeat algebraicam, an a cuius curuae quadratura pendeat. Quamuis vero haec methodus tam late pateat, tamen innumerae occurrere possunt progressionis per eum non summabiles, quarum quidem vel nullo alio modo summae assignari possunt, vt huius $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \dots + \frac{1}{2^n - 1}$, vel quarum summae etiam constant, vt huius $\frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{24} + \frac{1}{28} + \dots$ termino generali existente $\frac{1}{a^n - 1}$, in quo a et a numeros quoscunque integros praeter unitatem denotant; cuius summam esse $= 1$ demonstravit Celeberrimus Goldbachius. Quia autem eius terminus generalis proprie sic dictus non potest exhiberi, mirum non est, eam hac methodo non posse summari.